

## PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MR Z KONTRASTEM

1. W dniu poprzedzającym badanie należy:
  - wypić 2-3 litry wody niegazowanej
2. W dniu badania pacjent powinien:
  - nie jeść 4-5 godz. przed badaniem (w tym czasie zaleca się wypić ok 0.5l niegazowanej wody)
  - zabrać ze sobą:
    - skierowanie (nie jest wymagane)
    - dowód osobisty
    - poprzednie wyniki badań, dokumentację zdjęciową, wypisy ze szpitala dotyczące choroby
    - wyniki badań z krwi: kreatynina + GFR- ostatnie 2 tygodnie lub 1 tydzień w przypadku stwierdzonej choroby nerek

Na badanie zgłosić się do rejestracji 30minut przed planowaną godziną badania .

Uprzejmie prosimy o założenie wygodnej odzieży bez metalowych zapiek, aplikacji i ozdób, a także zdjąć metalową biżuterię, zegarek.

Badanie MR piersi celem poprawy specyficzności badania powinno być wykonane między 5 a 13 dniem cyklu (również u kobiet przyjmujących antykoncepcję doustną), 4 tygodnie po odstawieniu HTZ oraz 3-6 miesięcy po zabiegu operacyjnym lub biopsji piersi (chyba, że celem badania jest wykluczenie wielogniskowości choroby rozpoznanej w biopsji).