

BIOPSJA FUZYJNA PRZOSTATY

Zalecenia po biopsji

1. Biopsja stercza nie wpływa istotnie na stan pacjenta. Jednak aby zminimalizować ryzyko powikłań przez tydzień należy prowadzić oszczędzający tryb życia oraz kontynuować profilaktykę antybiotykową wg zaleceń urologa.
2. U części pacjentów po biopsji występują niewielkie, samoistnie ograniczające się krwawienia, które mogą mieć charakter: obecności krwi w nasieniu (czerwone lub rdzawe zabarwienie), w moczu lub w stolcu. W zdecydowanej większości nie wymagają one interwencji medycznej. W przypadku masywnego, nieustępującego krwawienia z dróg moczowych lub odbytnicy należy się zgłosić na ostry dyżur urologiczny.
3. U mniej niż 5% pacjentów może dojść do infekcji układu moczowo-płciowego. Jeśli temperatura ciała przekracza 38 °C i/lub pojawiają się dreszcze należy się zgłosić na ostry dyżur urologiczny.
4. Sporadycznie (około 0,2% pacjentów) może dojść do przejściowego zatrzymania moczu spowodowanego obrzękiem tkanek stercza po biopsji. W przypadku niemożności oddania moczu należy się zgłosić na ostry dyżur urologiczny.
5. Proszę się zgłosić po odbiór wyniku badania histopatologicznego za 2 / 3 tygodnie (po wcześniejszym porozumieniu telefonicznym pod numerem telefonu 22 120 20 36 . Wynik wydaje urolog, który na jego podstawie ustala dalsze postępowanie.